

(平均値) R6.5.27時点

| 飼料の種類 | かび毒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重金属 | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------|------------|--------|--------|-----------|--------------------|-------|---------|---------|------------------|-------|------|------|------|
| | μg/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mg/kg | | | | | | |
| | 15-アセチルデオキシニハノール | 3-アセチルデオキシニハノール | HT-2tキニン | T-2tキニン | α-セトラノール | β-セトラノール | フラスキニンB1 | フラスキニンB2 | フラスキニンG1 | フラスキニンG2 | オクタキニンA | シタロキニンA | シロニン | スリリアトクスタチン | セトラノリン | セトラノリン | デオキシニハノール | デオキシニハノール-3-グルコシド* | ニハノール | ネオリアノール | フラスキニンX | フラスキニン(B1+B2+B3) | カドミウム | ヒ素 | 鉛 | 水銀 |
| 大すう育成用配合飼料 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | 51 | 250 | 150 | 16 | | | 790 | | | | |
| 成鶏飼育用配合飼料 | 96 | 23 | 7 | 5.9 | 4.3 | 16 | 0.8 | | | | 0.9 | | | 0.5 | 2 | 53 | 410 | 76 | 36 | | 32 | 586 | 0.16 | 0.21 | 0.85 | 0.04 |
| ブロイラー肥育前期用配合飼料 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 150 | 23 | 28 | | | 1200 | | | | |
| ブロイラー肥育後期用配合飼料 | 22 | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | 9.2 | 100 | 19 | 55 | | | 204 | | | | |
| 肉用種鶏飼育用配合飼料 | 22 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 55 | 120 | 33 | 80 | | | 170 | | | | |
| 種鶏飼育用配合飼料 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 340 | 83 | 17 | | | 1100 | | | | |
| 大雛飼育用配合飼料 | 140 | | | 8 | | | | | | | | | | 3 | 61 | 570 | 65 | 20 | | | | 1600 | 0.05 | 0.21 | | 0.03 |
| ほ乳期子豚育成用配合飼料 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 6 | 5 | | | 380 | | | | |
| 子豚育成用配合飼料 | 125 | | 6 | 6 | | | 1.3 | 1 | | | | | 1 | 4 | 37 | 313 | 68 | 17 | | | | 528 | | 0.07 | | |
| 肉豚肥育用配合飼料 | 73 | | 16 | 6.2 | | 5 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | | | | 0.6 | 3 | 44 | 394 | 72 | 39 | | | 13 | 1009 | | 0.05 | | 0.01 |
| 種豚育成用配合飼料 | 64 | | 6.5 | 4 | | | | | | | 0.7 | | 0.5 | | 35 | 230 | 57 | 14 | | | | 1452 | | | | |
| 種豚飼育用配合飼料 | 67 | | | | | 8 | 1 | | | | 0.3 | 14 | 0.4 | | 33 | 293 | 45 | 51 | | | | 760 | | | | |
| 豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの) | 17 | 15 | | | | 5 | 0.4 | | | | 0.5 | | 1.2 | | 8.5 | 150 | 28 | 24 | | | | 485 | | | | |
| ほ乳期子牛育成用配合飼料 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 20 | 14 | | | | 1100 | 0.06 | | | |
| 若令牛育成用配合飼料 | | | | 3 | | | 3 | | | | 0.5 | | 0.7 | | 32 | 188 | 59 | 31 | | | | 415 | | | 0.40 | 0.04 |
| 乳用牛飼育用配合飼料 | 44 | | | | | | | | | | 0.3 | | | | 13.5 | 140 | 41 | | | | | 282 | | | | |
| 幼令肉用牛育成用配合飼料 | | | | 7 | | 3 | | | | | 0.7 | | | | 53 | 847 | 105 | 61 | | 13 | | 953 | | | | |
| 肉用牛肥育用配合飼料 | 72 | | 9 | 3.5 | | 5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | | | | 0.8 | 4 | 46 | 375 | 66 | 23.3 | 2 | | | 533 | | | | 0.01 |
| 肉牛繁殖用配合飼料 | 85 | | | | | 14 | 0.6 | | | | 0.5 | | 0.5 | | 49 | 635 | 108 | 120 | | | | 515 | | | | |
| 種牛飼育用配合飼料 | 45 | | | | | | | | | | | | | | 28 | 410 | 41 | 33 | | | | 400 | 0.04 | 0.09 | 0.40 | 0.01 |
| 牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの) | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | 5 | | | | 270 | | | | |
| 牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの) | | | | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | 510 | | | | |
| 牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの) | 106 | | | | | | | | | | | | | | 42.3 | 463 | 103 | 30 | | | | 563 | | | | |
| 養魚水産動物用配合飼料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.61 | 2.52 | 0.48 | 0.16 |
| 二種混(その他のもの) | 150 | 14 | | | | | | | | | | | | | 80 | 710 | 110 | 16 | | | | 2500 | | 0.09 | | |

(平均値) R6.5.27時点

| 飼料の種類 | かび毒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重金属 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------------------|-------|---------|---------|------------------|-------|------|------|------|--|
| | μg/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mg/kg | | | | | | |
| | 15-アセチルデオキシニハノール | 3-アセチルデオキシニハノール | HT-2tキシン | T-2tキシン | α-セアラノール | β-セアラノール | フアラキシンB1 | フアラキシンB2 | フアラキシンG1 | フアラキシンG2 | オクラキシンA | シトキシニハノール | シロニン | スリリアトキシチン | セアラノール | セアラノール | デオキシニハノール | デオキシニハノール-3-グルコシド* | ニハノール | ネオアラノール | フアラキシンX | フアラキシン(B1+B2+B3) | カドミウム | ヒ素 | 鉛 | 水銀 | |
| その他の混合飼料(成分量非表示) | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 10 | 25 | | | | 27 | | 0.24 | | | |
| とうもろこし | 115 | 14 | 22 | 9.29 | 3.5 | 5.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | | 0.5 | 3 | 8 | 1.2 | 4.3 | 37 | 444 | 80 | 28 | 5.33 | 11 | 1039 | | | | | |
| マイロ | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | | 2 | | 8 | 210 | | 7 | | | | | | |
| 小麦 | | | | | | | | | | | 0.9 | | 5 | 0.3 | | 4 | 140 | 37 | 3 | | | | | | | | |
| 大麦 | | 11 | | | | | | | | | 0.4 | | | 3 | | 1.2 | | 5 | | | | | | | | | |
| 綿実 | | | 19 | 26 | | | | | | | | 2 | | | | | 31 | | 9.4 | 3 | | | | | | | |
| 脱脂ぬか | | | | | | | | | | | | | | | 7.8 | 16 | 4 | 17 | | | | | | | | | |
| コーングルテンフィード | 394 | 82 | 24 | 12 | | | | | | | 1.13 | 2.9 | | 1.0 | | 272 | 2857 | 304 | 69 | 3.6 | | 260 | | | | | |
| コーングルテンミール | 72 | | 38 | 21 | 5.9 | 11.7 | | | | | 7 | 4 | 8.3 | | 17 | 549 | 225 | 16 | 8.3 | 4 | | 1640 | | | | | |
| ふすま | | | 12 | | | | | | | | 1.2 | | | 0.6 | | 4.75 | 197 | 42 | 30 | | | | | | | | |
| 麦ぬか | 18 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | 390 | 1800 | | 49 | | | | | | |
| とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル | 514 | 34 | 19 | 9.3 | | | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.4 | | | | | 328 | 2983 | 463 | 23 | | | | | | | | |
| 大豆油かす | 11 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | 2 | 17 | | | | | | | | |
| 魚粉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.78 | 5.05 | 0.57 | 0.43 | |
| 原料混合肉骨粉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 | |
| アルファルファ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 0.17 | | 0.04 | |
| チモン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.06 | | 0.04 | |
| スーダングラス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.18 | 0.2 | | |
| バミューダグラス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.24 | | 0.1 | |
| 稲わら | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | 2.9 | 0.4 | 0.06 | |
| オーツヘイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.22 | | 0.04 | |
| ウィートヘイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.22 | | 0.03 | |

(平均値)

R6.5.27時点

| 飼料の種類 | 残留農薬 | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| | µg/kg | | | | | | | | |
| | グリホサート | クロルピリホス | クロルピリホスメチル | シプロロリン | テルメタリン及びトクロメタリン | ヒリホスチル | プロキシメブ | ハルメタリン | マラチオン |
| その他の混合飼料(成分量非表示) | | | | | | | | | |
| とうもろこし | 30 | 16 | | | | 163 | | 53 | 121 |
| マイロ | | | | | | | | | |
| 小麦 | | | | | | | | | |
| 大麦 | | | | | | | | | |
| 綿実 | | | | | | | | | |
| 脱脂ぬか | | | | | | | | | |
| コーングルテンフィード | | | | | | | | | |
| コーングルテンミール | | | | | | | | | |
| ふすま | | | | | | | | | |
| 麦ぬか | | | | | | | | | |
| とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル | | | | | | | | | |
| 大豆油かす | | | | | | | | | |
| 魚粉 | | | | | | | | | |
| 原料混合肉骨粉 | | | | | | | | | |
| アルファルファ | | | | 1400 | | | | | |
| チモン | | | | 260 | | | | | |
| スーダングラス | | | | | | | | | |
| バミューダグラス | | | | | | | | | |
| 稲わら | | | | | | | | | |
| オーツヘイ | | | | | | | | | |
| ウイートヘイ | | | | | | | 110 | | |